

רשימת נתונים הכרחיים לפני ביצוע הסדציה

- Allergies היסטוריה רפואית
- Medications
- Past medical history
- Last meal
- Events
- בדיקה גופנית - לב, ראות, סימנים חיוניים, Airway
- הכנת ציוד ניטור והחיה
- צוות
- מעקב עד לשחרור

הצוות

- רמת הצוות וסוג הניטור תלוי בדרגת הסדציה המתוכננת ובהמשך בדרגת הסדציה שהגענו אליה בזמן הפעולה.
- בכל דרגת סדציה ישנם שני בעלי תפקידים:
רופא אחראי ומטפל שני.
- רופא אחראי – בוגר קורס סדציה
בוגר קורס החיאה לילדים (APLS,PALS)
כשיר להחדיר עירווי
- מטפל שני – רופא, אחות, פרמדיק, סייעת לרופא שיניים
בוגר קורס סדציה
בוגר קורס החיאה לילדים

הצוות

- בסדציה שטחית הרופא האחראי יכול גם לבצע את הפעולה.
- סדציה עמוקה תבוצע על ידי רופא מרדים
- במידה וחל שינוי ברמת הסדציה יש לקרוא לסיוע

הכנת אתר הסדציה

- מקור חמצן
- סקשיין
- מוניטור
- ציוד לניהול נתיב האוויר
- ציוד להחדרת עירוני
- תרופות החיאה
- דפיברילטור

מה לנטר בזמן הסדציה

- דרגת הסדציה
- אוורור
- חמצון
- המודינמיקה

ניטור – מצב ההכרה

תגובה מוטורית **Motor Activity Assessment Scale**

- מבצע פקודות – סדציה קלה
- מגיב לקריאה או למגע קל – סדציה בינונית
- מגיב לכאב – סדציה עמוקה
- אינו מגיב לכאב – הרדמה כללית

ניטור - אורור

- הערכה קלינית

ראיה - תנועות נשימה ללא סימנים
לחסימה

שמיעה - קולות נשימה

משוש - תנועת אויר

- מדידת CO2 באוויר הננשף

- Apnea monitor - impedance plethysmography

- סטורציה - ???

ניטור

הערכה קלינית – הכרה ואורור

תמצון - מד סטורציה

הערכה קלינית

מד סטורציה

לחץ דם

ECG

CO₂

סדציה קלה –

סדציה בינונית -

רשום סימנים חיוניים

- מידי 5 דקות
- לאחר כל תוספת של תרופה
- סוף הפעולה
- בהתאוששות
- בשחרור

שחרור לאחר סדציה

משתעל, נושם עמוקות, בוכה	.2
דיספנאה, נשימה שטחית	.1
אפניאה או צורך בסיוע לפתיחת נתיב אויר	.0
סטורציה מעל 90% באויר חדר	.2
זקוק לתוספת חמצן לשמירת סטורציה	.1
סטורציה מתחת ל 90% עם חמצן	.0
לחץ דם ללא שינוי משמעותי 10%	.2
לחץ דם השתנה ב 10%-25%	•
לחץ הדם השתנה ביותר מ 25%	.0
ערני	.2
ישנוני ניתן להעירו	.1
לא מגיב	.0
מינימלי	.2
בינוני	.1
קשה	.0
תנועות מכוונות	.2
תנועות לא מכוונות	.1
ללא תנועה	.0

• אורור

• חמצון

• המודינמיקה

• הכרה

• כאב

• תנועה

שחרור לאחר סדציה

ציון 9 = שחרור

סיבות נוספות לדחיית שחרור

דמום

חסר יציבות בעמידה או ישיבה

בחילות והקאות

קושי במתן שתן